


A primeira fase da produção é chamada de cria, onde o foco do produtor é a produção de bezerros, também chamados de terneiros no sul. Que consiste no período que vai da concepção até a desmama, incluindo a gestação, de cerca de 9 meses, o nascimento e mais 8 meses até o desmame.

Para que a vaca consiga produzir um bezerro por ano, deve emprenhar novamente cerca de 59 dias após o parto. Entretanto, enquanto estiver em gestação, ela amamenta outro por cerca de 8 meses, até que ele esteja com aproximadamente 210 kg, que é o peso da desmama.

É na primeira fase da vida que os animais apresentam a _____ conversão alimentar, como podemos observar neste esquema.

Note que a resposta, e o retorno econômico com o uso de ração é muito melhor em animais jovens que em animais adultos ou velhos. Portanto, a viabilidade de suplementação dos bezerros é melhor que a de suplementação das vacas, e foi baseado nestes dados que surgiu o creep feeding.



Entretanto, devemos destacar ainda, a _____ das matrizes, pois é a base do rebanho, tanto que costumamos dizer que a vaca é “forma” onde teremos a oportunidade de somar com a qualidade genética dos touros, seja pensando nos bezerros machos que serão comercializados, mas principalmente para as fêmeas que serão incorporadas ao plantel nos próximos anos como futuras matrizes. E portanto, é fundamental ter no plantel, animais com boa genética, para que a próxima geração possa ser mais eficiente em conversão alimentar, ganhando mais peso e entrando em reprodução mais cedo, ou sendo abatidos mais jovens.

Mas, também é fundamental que o produtor tenha os cuidados com o manejo reprodutivo, e para isso é importante:

- Seguir uma estação de monta;
- Obter baixa taxa de mortalidade;
- Aplicar pressão de seleção para excluir do rebanho os animais de menor fertilidade; e
- Para controlar isso tudo, vai ser necessário numerar o rebanho e efetuar o controle individual do plantel.

O pecuarista também precisa estar atento à nutrição dos animais, pois as vacas têm cerca de _____ de peso vivo, portanto, elas comem bastante, principalmente quando paridas e gerando outro bezerro.

Desta forma, é fundamental que tenha boa disponibilidade de forragem nas pastagens, pois o custo para tratá-las com suplementação no cocho é elevado, e quase nunca é viável do ponto de vista econômico. Portanto, o criador deve ter suas pastagens corrigidas e bem manejadas, e sempre estar atento para manter a taxa de lotação ajustada à capacidade dos campos, para evitar o “rapador” nos pastos, e as enormes dificuldades decorrentes desta situação.

Um erro estratégico comum é atrasar a venda dos animais quando os preços estão caindo, isso aumenta a taxa de lotação, reduz a disponibilidade de forragem e acelera a degradação das pastagens, que ocorre principalmente na entrada do período seco, o que pode trazer grandes problemas e prejuízos nos próximos meses.

O produtor que trabalha com cria, deve ter um bom entendimento sobre as medidas profiláticas e _____, de modo que todas estejam devidamente organizadas em um calendário sanitário da propriedade. Isso é importante para evitar que os problemas decorrentes de doenças reprodutivas aumentem os abortos e a mortalidade pós parto, o que conseqüentemente irá reduzir a taxa de desmame da propriedade. E ainda, tem os parasitas, que reduzem o ganho de peso e aumentam a mortalidade, principalmente em rebanhos de alto padrão genético que são mais sensíveis aos carrapatos e vermes gastrointestinais.

